



Dierenkliniek Emmeloord

Espelerlaan 77 | 8302 DC Emmeloord | ☎ 0527 613500



DIERENARTSEN PRAKTIJK PURMEREND

DIERZAME ZORG

Purmersteenweg 13c 1441 DK Purmerend 0299-421000 www.dierenartspurmerend.nl



Spoeisende hulp voor uw Paard

BLIJF KALM!

In geval van nood is het belangrijk voor uw paard dat u zo rustig mogelijk reageert zodat er geen onnodige stress ontstaat. Let goed op de conditie en gedrag van uw paard voordat de dierenarts gebeld wordt. Deze informatie heeft de dierenarts nodig om de situatie zo goed mogelijk in te kunnen schatten. Zorg ervoor dat u ook na het gesprek bereikbaar blijft voor de dierenarts.



Normaalwaarden

	Volwassen paard	Pasgeboren veulen
Temperatuur	37,4-38,0 °C	38,5-39,0 °C
Hartslag	28-40 slagen/min	60-100 slagen/min
Ademhaling	8-14 ademhalingen/min	20-40 ademhalingen/min

Verminderde eetlust Niet eten

Klinische verschijnselen:

- proppen maken
- eet wel hooi, maar geen krachtvoer of andersom
- wel opname van voer, maar niet kauwen
- eet traag of geen aandacht voor het voer

Wat te doen:

- opnemen temperatuur
- kijk of er mest in de stal ligt en hoeveel
- bekijk de consistentie van de mest (diarree/hard en droog)
- verwijder tijdelijk het voer dat blijft liggen
- bekijk of het paard koliekverschijnselen laat zien
- controleer de waterbak en opname van water (via aanbieden emmer)
- bel de dierenarts

Neusuitvloeiing

Klinische verschijnselen:

- pus, voedsel en/of speeksel uit de neus
- uit een of beide neusgaten bloed
- hoesten
- paard kan onrustig zijn en met het hoofd schudden

Wat te doen:

- temperatuur opnemen en ademhaling tellen
- inspecteer kaak- en keelregio op zwellingen
- bij benauwdheid voer verwijderen
- probeer paard rustig te houden, geen inspanning leveren
- bij gele/groene neusuitvloeiing contact met andere paarden beperken ivm besmettelijkheid
- bel de dierenarts

Zwelling van één of meerdere benen



Klinische verschijnselen:

- één of meerdere benen zijn gezwollen
- evt. stijf en/of kreupelheid zichtbaar of verminderd belasten
- niet willen eten

Wat te doen:

- vergelijk de benen met elkaar, is de zwelling symmetrisch en/of lokaal?
- temperatuur opnemen
- inspecteer op wondjes
- verplaats het paard niet bij ernstige kreupelheid
- koud afdouchen van het gezwollen been
- bel de dierenarts

Verwonding(en)

Klinische verschijnselen/vragen:

- bij diepe verwondingen direct de dierenarts bellen
- afhankelijk van de locatie van verwonding (bv. ooglid, pees, gewricht)
- hoe is het gebeurd?
- gezwollen randen rondom verwonding?
- wat is zichtbaar in de verwonding?
- hoe groot is de verwonding?

Wat te doen:

- bel eerst de dierenarts!
- koud afdouchen in overleg met de dierenarts
- geen lokale zalven, klei e.d. aanbrengen
- bij bloedingen: stelpen met schone doeken en evt. bandage aanleggen, bandage niet verwijderen voordat de dierenarts er is
- controleer datum laatste tetanus vaccinatie



Koliek



Klinische verschijnselen:

- krabben met voeten
- naar de buik kijken
- strekken alsof het paard moet plassen
- opkrullen van de bovenlip (flemen)
- zweten
- verhoogde en zware ademhaling
- liggerig en willen rollen
- paard kan onrustig of soms ook agressief zijn
- sloom en niet willen eten

Wat te doen (wanneer het paard benaderbaar is!):

- temperatuur opnemen, hartslag en ademhaling tellen
- 10 à 15 minuten aan de hand stappen, geen uren!
- voer verwijderen
- let op mesten en afkomen gas
- niet met geweld het paard overeind houden
- bel de dierenarts

Acuut pijnlijk oog

Klinische verschijnselen:

- zowel boven- als onderooglid kan gezwollen zijn
- paard knijpt pijnlijk met oog
- verergert in fel licht
- tranen en/of uitvloeiing in de binnenste ooghoek
- kan het paard wat zien?

Wat te doen:

- zet het paard in een donkere omgeving
- indien mogelijk oog controleren op beschadigingen
- bel de dierenarts



Acuut kreupel

Klinische verschijnselen:

- een of meerdere benen ernstig kreupel
- wil het been niet of nauwelijks belasten
- wil niet van de plaats afkomen
- loopt erg gevoelig en korte passen
- heeft het recent een behandeling in de spieren (injectie, vaccinatie) gehad?

Wat te doen:

- paard niet verplaatsen
- vergelijk de benen en controleer op warmte, zwelling en wondjes
- krab de hoeven uit en controleer op scherpe voorwerpen.
- Verwijder deze NIET!**
- bel de dierenarts

Allergische reactie

Klinische verschijnselen:

- kan optreden na toedienen vaccinatie, medicijnen, ontworming e.d.
- kan optreden na insecten- en /of reptielenbeten
- zwelling ter hoogte van toedieningsplaats/beet of uitgebreide reactie over het gehele lichaam
- zwelling van neus, oogleden, koker en keelregio
- stijfheid en niet van de plaats willen komen
- bijgeluid bij het ademen: snurkend geluid vanuit keel

Wat te doen:

- bel direct de dierenarts, zeker bij moeizaam ademen
- bij zwelling lokaal koelen
- verwijder voer
- verplaats het paard naar koele plek uit de zon
- bel de dierenarts