



P. Bleeker  
M.H.J. Kreutzelman  
F.H. Prud'homme van Reine  
E.J. van de Velde  
J.S. van der Weele  
M. de Wit  
A.M. Reijne  
M. Waij-Hartog  
D. Gouwens  
T. van Eekeren

## **Nieuwsbrief nummer 2 - 2010**

### **Collegawissel**

Nico Boensma is per 1 juli geëmigreerd naar Frankrijk. Zijn werk als paardendierenarts is sindsdien overgenomen door Dory Gouwens. Zij was al werkzaam bij ons in de gezelschapsdieren, maar zet zich nu dus ook in voor uw paarden. In haar vrije tijd rijdt Dory Z1 dressuur.

### **Droes**

De tijd van het afspenen en naar de opfok gaan van de veulens is weer aangebroken. Hierbij komt ook het risico van droes kijken. De kenmerken van droes zijn verhoogde temperatuur, lymfeknoopzwellings of abcessen, neusuitvloeiing, hoesten, benauwdheid. Vanaf het moment dat er abcessen zijn ontstaan is er geen behandeling meer mogelijk, en moeten de abcessen rijpen en opengaan. Het is belangrijk de besmette dieren te scheiden van de gezonde paarden en ieder contact tussen deze te vermijden. Het is mogelijk tegen droes te vaccineren vanaf 4 maanden leeftijd. Het vaccin wordt toegediend in de bovenlip. De basisvaccinatie bestaat uit 2 injecties met 4 weken ertussen. Daarna moet de vaccinatie om de 3 tot 6 maanden herhaald worden.

### **Rhinopneumonie**

Rhinopneumonie komt voor in 3 vormen. Als eerste de verkoudheidsvorm die vaak voorkomt bij jonge paarden. Tegen deze vorm kan goed gevaccineerd worden, dit moet minimaal 2x per jaar gedaan worden. Als tweede de abortusvorm. Vaccinatie geeft beperkte bescherming en moet in de 5<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> maand van de dracht gegeven worden. Als derde de incidenteel voorkomende neurologische vorm. Hiertegen is vaccineren waarschijnlijk niet effectief. Wel kan vaccineren ervoor zorgen dat de infectiedruk sterk verlaagt. Belangrijk is het om drachtige merries en jonge paarden gescheiden te houden, direct contact met vreemde paarden te vermijden en liefst de hele stal te vaccineren om de infectiedruk laag te houden.

### **Mok**

Mok is een verzamelnaam voor huidirritaties aan de onderbenen. Mok kan vele oorzaken hebben en er spelen vaak verschillende factoren tegelijk een rol. Invloeden van buitenaf zoals vocht, vuil en ammoniak spelen een belangrijke rol. Hierbij kunnen dan bacteriën en soms mijten komen. De symptomen zijn roodheid, korsten, vochtig eczeem, jeuk en in erge gevallen dikke benen en kreupelheid. De behandeling verschilt per paard en hangt af van de oorzaak van de mok. Het is verstandig om te laten beoordelen door een dierenarts wat voor uw paard de meest geschikte behandeling is, zeker wanneer de benen dik zijn of uw paard kreupel is.

Heeft u vragen over deze onderwerpen, neem dan gerust telefonisch contact op met één van onze paardendierenartsen via 0299-42 1000. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via het contactformulier op onze website: [www.dierenartspurmerend.nl](http://www.dierenartspurmerend.nl)

Team DAP Purmerend